

Guia de Orientação ao Paciente

☐ Sulfasalazina ☐ Mesalazina

ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO GRATUITAMENTE PELO SUS.

SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE BENEFICIAR COM O TRATAMENTO.

O MEDICAMENTO É UTILIZADO NO TRATAMENTO DA RETOCOLITE ULCERATIVA.

1. ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO

- Guarde estes medicamentos protegidos do calor e da umidade, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).
- Conserve os comprimidos, cápsulas, supositórios ou enemas na embalagem original.
- Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças.

2. NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO

- Existem quatro apresentações dos medicamentos: comprimido, cápsula, enema e supositório.
- Se o medicamento for na forma de comprimido ou cápsula, tome-o inteiro, sem abrir ou mastigar. A sulfasalazina deve ser tomada após as refeições para diminuir a irritação gástrica, a mesalazina, antes das refeições e na hora de deitar com um copo cheio de água.
- Se o medicamento for na forma de supositório ou enema, deverá ser usado **por via retal**, ou seja, **pelo ânus**. Antes de inserir o enema, agite bem para que a solução se misture.
- Em caso de esquecimento de uma dose, aguarde para tomar a próxima no horário usual. **Não tome a dose dobrada.**

3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS

- Apesar dos benefícios que estes medicamentos trazem, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis. Para sulfasalazina podem aparecer dores de cabeça, reações alérgicas na pele, sensibilidade aumentada da pele à luz solar, náuseas, vômitos, dores abdominais, cansaço e fraqueza, entre outros. Para mesalazina podem aparecer náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais, dores de cabeça, cansaço, perda de cabelo e reações alérgicas na pele, entre outros.
- Se sentir algum desses sintomas, não interrompa o tratamento sem comunicar ao médico.
- Se outros sintomas aparecerem, comunique-se com seu médico.
- Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, documento assinado por você e seu médico.

4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico. Procure a orientação de um profissional da saúde caso necessite fazer uso de outros medicamentos.

5. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO

- A realização dos exames garante uma correta avaliação sobre o que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar a dose ou até suspender o tratamento.



6. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Em caso de gravidez, comunique-se com seu médico.
- Não é recomendada a amamentação durante o tratamento, pois pequenas quantidades de medicamento podem passar para o leite, trazendo problemas para o feto.
- Estes medicamentos não devem ser utilizados por crianças com menos de 2 anos.
- Pode haver descoloração da urina ou pele, mas são reações esperadas. Caso isto ocorra, comunique-se com seu médico.

7. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Retorne à farmácia em um mês, com os seguintes documentos:
 - receita médica;
 - documento de identidade.
- O farmacêutico irá lhe indicar alguns exames laboratoriais para serem encaminhados na próxima dispensação.

8. EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.

Guia de Orientação ao Paciente

☐ Azatioprina/6-Mercaptopurina ☐ Ciclosporina

ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO GRATUITAMENTE PELO SUS.

SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE BENEFICIAR COM O TRATAMENTO.

O MEDICAMENTO É UTILIZADO NO TRATAMENTO DA RETOCOLITE ULCERATIVA.

1. ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO

- Guarde estes medicamentos protegidos do calor e da umidade, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).
- Conserve os comprimidos na embalagem original, bem fechados e protegidos da luz.
- Mantenha os medicamentos fora do alcance de crianças.

2. NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO

- Os medicamentos podem ser tomados durante ou após as refeições, sempre com bastante líquido. O importante é fixar o horário e seguir sempre o mesmo esquema.
- Se você toma a azatioprina uma vez ao dia, em caso de esquecimento de uma dose, aguarde para tomar a próxima no horário usual. **Não tome a dose dobrada.** Se você toma várias vezes ao dia, em caso de esquecimento, tome o quanto antes, ou então aguarde para tomar no próximo horário a **dosagem dobrada.**
- Se você toma a ciclosporina, em caso de esquecimento de uma dose, esta deve ser tomada dentro de 12 horas. Caso contrário, aguarde para tomar a próxima dose no horário usual. **Não tome a dose dobrada.**

3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS

- Apesar dos benefícios que estes medicamentos trazem, é possível que apareçam algumas reações desagradáveis como dores abdominais, dores de cabeça, reações alérgicas, febre, calafrios, falta de ar, pressão baixa, aparecimento de bolhas entre outros.
- Se sentir algum desses sintomas, não interrompa o tratamento sem comunicar ao médico.
- Se outros sintomas aparecerem, comunique-se com seu médico.
- Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, documento assinado por você e seu médico.

4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS

- Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico. Procure a orientação de um profissional da saúde caso necessite fazer uso de outros medicamentos.

5. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Estes medicamentos podem causar problemas graves no feto, podendo nascer um bebê com graves defeitos físicos e mentais. Por isso, em caso de gravidez, **comunique-se com seu médico imediatamente.**
- Não é recomendada a amamentação durante o tratamento, pois pequenas quantidades de medicamento podem passar para o leite, trazendo problemas para o feto.
- Evite contato com pessoas portadoras de doenças infecciosas.
- Mantenha uma boa higiene bucal e procure fazer revisões com seu dentista durante o tratamento, pois podem ocorrer problemas devido ao uso destes medicamentos.
- Durante o tratamento, não faça uso de bebidas alcoólicas, pois pode ser prejudicial à sua saúde.



6. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO

- Retorne à farmácia em um mês, com os seguintes documentos:
 - receita médica;
 - documento de identidade.
- O farmacêutico irá lhe indicar alguns exames laboratoriais para serem encaminhados na próxima dispensação.

7. EM CASO DE DÚVIDAS

- Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.